

KOLONOSKOPIA

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA ZE ZNIECZULENIEM

Prawidłowe przygotowanie do badania ma kluczowe znaczenie dla jego bezpieczeństwa, jakości diagnostycznej oraz możliwości wykonania procedury.

CEL BADANIA:

Kolonoskopia umożliwia ocenę jelita grubego. W trakcie badań możliwe jest pobranie wycinków lub wykonanie innych procedur diagnostycznych.

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM CLENSIA:

Na 5 dni przed badaniem:

nie spożywać owoców, warzyw, produktów zawierających pestki i nasiona, pieczywa, maku i siemienia lnianego.

Wyjątkiem są ziemniaki, biały ryż, klarowne soki, tofu.

4 dni przed badaniem:

Zaprzestać przyjmowania preparatów żelaza (np. Hemofer, Sorbifer, Tardyferon) aż do dnia badania.

3 dni przed badaniem:

Zaprzestać przyjmowania leków zawierających kodeinę i loperamid aż do dnia badania.

2 dni przed badaniem:

Starać się wypić w ciągu doby co najmniej 2 litry płynów.

Można jeść bez ograniczeń nabiał, jajka, mięso, ryby, białe pieczywo (bez ziaren ani maku), jasny makaron.

Dzień przed badaniem:

Przyjąć leki stosowane przewlekłe, o ile lekarz nie dał innych zaleceń.

Do godziny 16.00 dieta jak w dniu poprzednim. Po tej godzinie nie należy już nic jeść.

Wieczne dawki leków należy przyjąć nie później niż godzinę przed rozpoczęciem picia preparatu Clensia.

Około godziny 22.00 rozpuścić w litrze wody niegazowanej lub przegotowanej 2 torebki oznaczone literą A (większe) oraz 2 torebki oznaczone literą B (mniejsze). Po rozpuszczeniu proszku można roztwór nieco schłodzić. Wypić sporządzony roztwór w tempie około 1 szklanki co 15 minut. Dodatkowo należy wypić ½ litra klarownych płynów (herbata, klarowne soki, napoje niegazowane).

Na następny dzień przygotować roztwór preparatu: rozpuścić w litrze wody pozostałe 2 torebki oznaczone literą A (większe) oraz 2 torebki oznaczone literą B (mniejsze). Po rozpuszczeniu proszku można roztwór schłodzić.

W dniu badania:

Przyjąć leki stosowane przewlekłe (o ile lekarz nie dał innych zaleceń) na godzinę przed rozpoczęciem picia preparatu Clensia. Nie należy przyjmować leków przeciwcukrzycowych!

Na 4 godziny:

przed badaniem wypić roztwór Clensia w tempie około 1 szklanki co 15 minut. Dodatkowo należy wypić ½ litra klarownych płynów (herbata, klarowne soki, napoje niegazowane).

Na 2 godziny:

przed badaniem nie należy już pić.

PRZYGOTOWANIE DO ZNIECZULENIE:

Badanie wykonywane jest w sedacji dożyłnej pod nadzorem lekarza anestezjologa. Przed badaniem Pacjent zobligowany jest do przestania wypełnionej ankiety.

Przed znieczuleniem jest KONIECZNOŚĆ WYKONANIA badań laboratoryjnych

- nie mogą być starsze niż 1 miesiąc

Elektrolity: stężenie Na, stężenie K, Układ krzepnięcia: INR i APTT

Badanie w znieczuleniu krótkiej sedacji

Po podaniu dożylnie środka usypiającego, Pacjent zasypia na kilkanaście minut. Podczas tego snu lekarz przeprowadza badanie. Lekarz anestezjolog po zakończeniu badania zaleci dietę lekkostrawną. Badanie wykonane w znieczuleniu ogólnym.

Konieczna jest obecność osoby towarzyszącej w celu odwiezienia Pacjenta do domu, około 2 godziny po rozpoczęciu badania.

Kategorycznie zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych przez około 12 godzin po znieczuleniu.

Znieczulenie ogólne do badania należy odwołać najpóźniej na dwa dni przed zabiegiem.